

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปี 2566

รายการยา	ปี 2566			ปี 2567 (1 ตค.66-15 มีค.67)		
	จำนวนผู้ป่วย	ความเหมาะสมด้านข้อบ่งใช้	ความเหมาะสมด้านขนาดยา	จำนวนผู้ป่วย	ความเหมาะสมด้านข้อบ่งใช้	ความเหมาะสมด้านขนาดยา
Vancomycin	17	17	17	4	4	4
Meropenem	43	43	37	13	13	11
รวม	60	60	54	17	17	15
คิดเป็นร้อยละ		100	90		100	88.24

การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (Drug Use Evaluation) โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กำหนดรายการยา DUE ทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้

1. Meropenem injection
2. Vancomycin injection

ประเมินความเหมาะสม 2 ด้าน ดังนี้

1. Indication: ด้าน Empirical therapy และ Specific therapy
2. Dose: ขนาดยาตามแหล่งติดเชื้อ น้ำหนัก และปรับตามการทำงานของไต

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ทำ DUE พบความไม่เหมาะสมในด้านขนาดการใช้ คือ 6 ราย (ร้อยละ 10) และ 2 ราย (ร้อยละ 11.76) ตามลำดับ

2. ด้านขนาดการใช้ที่ไม่เหมาะสม พบความไม่เหมาะสมกับค่าการทำงานของไต จำนวน 5 ราย และไม่เหมาะสมกับโรคที่วินิจฉัย (ขนาดยาในเชื้อหุ้มสองอักษในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ) จำนวน 1 ราย

การจัดการเบื้องต้น เภสัชกรทวนสอบ และพิจารณาร่วมกับแพทย์ปรับขนาดยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มการประเมินความเหมาะสมสำหรับ Empiric therapy ในด้านระยะเวลาที่ได้รับยา (Duration) หากใช้สำหรับ Empiric therapy จะต้องมีการส่งตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Sensitivity) และปรับการรักษาตามผลค่าความไวของเชื้อต่อยา

.....