



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๓/๘๘๓

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชี้แจงแนวทางการติดตามและการสั่งใช้ยามูลค่าสูง

เรียน แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วย ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้กำหนดแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและราคาของการรักษาเหมาะสมมูลค่าไม่สูงเกินไป จึงกำหนดการติดตามการใช้ยาที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ Meropenem

ทั้งนี้รายการยาที่มีการติดตามการใช้ยาที่มีมูลค่าสูง ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมได้จัดทำแบบฟอร์มการสั่งใช้ยา และแนวปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสิระ ชวรัตน์)


เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

นายพัฒนศักดิ์ ทังนาค

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ขั้นตอนการปฏิบัติการสั่งใช้ยามูลค่าสูง



แบบประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา Meropenem

โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ชื่อ-สกุล..... อายุ..... ปี HN..... AN..... เติ้ง.....
น้ำหนัก.....กก. SCr.....mg/dl CrCl.....ml/min ประวัติแพ้ยา ไม่แพ้ยา แพ้ยา.....

ตำแหน่งการติดเชื้อ ปอด ทางเดินปัสสาวะ กระแสเลือด ช่องท้อง เยื่อหุ้มสมอง อื่นๆ (ระบุ)

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ Gram stain Culture/sensitivity Urine อื่นๆ.....

เชื้อที่ทำให้เกิดโรค ไม่ทราบ ทราบ ได้แก่ *P.aeruginosa* *E.coli* *E.coli* (ESBL)

K.pneumoniae *K.pneumoniae*(ESBL) *Enterobacter* *A.baumannii* *P.mirabilis* *Citrobacter*

อื่นๆ (ระบุ)

ใช้ตามข้อบ่งชี้ต่อไปนี้

Empiric therapy

กรณีสงสัยการติดเชื้อ MDR gram negative bacilli หรือ mixed infection ที่ได้รับ 3rd หรือ 4th cephalosporin มาก่อนแล้วไม่ได้ผล

การติดเชื้อที่ไวต่อยาในกลุ่มอื่นๆ แต่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มอื่นๆ ได้ เพราะ

Specific therapy

การติดเชื้อรุนแรงจากแบคทีเรียชนิด ESBL +ve

การติดเชื้อที่ติดต่อยากกลุ่ม Cephalosporins, Aminoglycosides แต่ไวต่อ Meropenem

วิธีใช้..... จำนวน..... vial (..... days)

Dosage

Children \geq 3 เดือน : IV 30-120 mg/kg/day q 8 hr (Maximum dose: 6 g/day)

Adults : IV 1.5-6 g/day q 8 hr

Dosing adjustment in renal impairment

CrCl 26-50 ml/min : usual dose q 12 hr

CrCl 10-25 ml/min : 50% usual dose q 12 hr

CrCl $<$ 10 ml/min : 50% usual dose q 24 hr

Dialysis : administer dose after dialysis

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

(.....)

วันที่/...../.....

เภสัชกรผู้รับใบ DUE

(.....)

วันที่/...../.....